


2022年度ブルーカーボン量（ベースライン）

根拠1  
三重県南伊勢町神前浦地区のうち、水深10m以浅、岩礁が基質の箇所を活動区域として選定。  
活動前に地元漁業者による聞き取り及び活動前のモニタリングにおいて対象活動区域での海藻類の繁茂が確認されていない区域を活動区域として選定。







2024年度ブルーカーボン量（ベースライン）

根拠 2  
本プロジェクトの活動開始から現在までの期間において、本項目と同様の熊野灘地域の一部のポイントにおいて、一時ウニ類駆除活動により海藻類が繁茂したが、その後当該ポイントで駆除活動を行わない期間を設けたところ、再び海藻類が無くなった。


根拠1, 2よりプロジェクトの活動により藻場が維持・回復していると推測され、プロジェクトを実施しない場合、藻場が消失すると考えられることから、ベースライン 0 とする。




プロジェクトを実施しないと磯焼けに戻る状況  
撮影場所はすべて同じポイント（右上図中のポイントに該当）における経年変化




2016/5  
海藻被度  
0 %




2019/5  
海藻被度  
50 %




2022/5  
海藻被度  
70 %



2017/5  
海藻被度  
20 %




2020/5  
海藻被度  
95 %




2023/5  
海藻被度  
35 %



2018/5  
海藻被度  
65 %



2021/5  
海藻被度  
85 %



2024/5  
海藻被度  
5 %